

U wordt uitgenodigd voor een onderzoek van de longen.

De werking van de longen kan op verschillende wijzen worden vastgesteld. Bij de longfunctietest wordt de hoeveelheid lucht gemeten die u maximaal kunt in- en uitademen.

Om de snelheid te bepalen, ademt u door een mondstuk.

Het mondstuk is verbonden met de computer.

Een klem op de neus verhindert, dat u door uw neus ademhaalt.

Maar wees gerust, u krijgt regelmatig korte pauzes zodat u weer normaal kunt ademen.

Het onderzoek duurt 45 tot 60 minuten.

Vorbereiding:

U hoeft niet nuchter te zijn. Komt u op tijd om rustig en ontspannen met het onderzoek te beginnen.

Een aantal medicijnen moeten voor de test gestopt worden (zie medicijnen).

Ook mag u 1 uur voor het onderzoek niet roken, 2uur van te voren niet eten, geen alcohol drinken en geen zware inspanningen verrichten.

Het onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk en wordt niet als belastend of onprettig ervaren. De praktijkondersteuner (POH) heeft een speciale opleiding gevolgd om deze test uit te kunnen voeren.

Bij het onderzoek wordt de hoeveelheid lucht gemeten die u maximaal kunt in- en uitademen.

Om de snelheid te bepalen waarmee u kunt uitblazen, moet u dit ook een aantal

keren heel krachtig doen. Zo nodig wordt de blaastest herhaald na het toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn.

Verhinderd?

Als u om de een of andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact met de praktijk op.

Jaarlijkse Controles

Bij jaarlijkse controles krijgt u de afspraak voor het volgende jaar al mee. Noteer deze goed, om het niet te vergeten.

Medicijnen:

Er zijn een aantal medicijnen die invloed hebben op de onderzoek -resultaten. Deze dient u tijdelijk te stoppen voor het onderzoek.

24 uur voor het onderzoek niet meer innemen:

Spiriva Atrovent
Onbrez Eklira
Seebri Incruse
Montelukast (Singulair)

12 uur voor het onderzoek niet meer innemen:

Foradil Formoterol
Oxis Onbrez
Seretide Striverdi
Serevent DuoResp
Symbicort Flutiform
Foster Relvar
Atimos Anoro
Duaklir Ultibro

6 uur voor het onderzoek niet meer innemen:

Aeromir Atrovent
Berodual Berotec
Bricanyl Combivent
Ventolin Salbutamol

48 uur voor test:

geen montelukast gebruiken



Huisartspraktijk
Dr. S. Köthe
St. Odastraat 22
6002 BD Weert
tel: 0495-53 33 93

www.huisartspraktijkboshoven.nl

Assistentes:

*Roelie Brackenie - Koetsier
Anita Lemmers - Reijnen
Stephanie Brackenie
Mirlanda Moors-Peeters*

Praktijkondersteuners:

*Maaïke Heemskerk
Maria Timmermans
Dave Hubben*

Praktijkmanager:

Tahnée Creemers



**Longfunctie-
onderzoek**

U wordt verwacht op:

Dag:.....

Datum:.....

Tijd:.....